

Posiadacz zezwolenia:

Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 21 73 38 34 11, fax.: +49 21 73 38 49 27

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

AROMOL 1,62 RB

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

Fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – **1,62%** (16,2 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R - 165/2013 z dnia 19.12.2013 r.

I OPIS DZIAŁANIA

Aromol 1,62 RB jest preparatem przeznaczonym do ochrony roślin przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ślimaki w formie gotowej do rozsypania przynęty. Po jej spożyciu ślimaki tracą apetyt, przestają żerować i schodzą z roślin. Środek jest przeznaczony do ograniczania żerowania ślimaków na roślinach warzywnych i ozdobnych w amatorskiej uprawie roślin w ogrodach przydomowych oraz na balkonach i tarasach.

**II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY WARZYWNICZE**

1. Warzywa kapustne

Ślimaki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m².

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 5 g/m².

Rozsypywać równomiernie pomiędzy roślinami.

Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów żerowania ślimaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp między zabiegami: 2 - 4 tygodnie.

2. Sałata siewna

Ślimaki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m².

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 5 g/m².

Rozsypywać równomiernie pomiędzy roślinami.

Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów żerowania ślimaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp między zabiegami: 2 - 4 tygodnie.

ROŚLINY OZDOBNE

1. Aksamitka, Funkia

Ślimaki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m².

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 5 g/m².

Rozsypywać równomiernie pomiędzy roślinami.

Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów żerowania ślimaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp między zabiegami: 2 - 4 tygodnie.

UWAGI

1. Środek stosować po południu lub wieczorem, gdy ślimaki opuszczają swoje kryjówki. Zaleca się ponowne rozsianie gdy preparat zostanie w całości zjedzony.

2. Przy silnej presji szkodnika środek należy zastosować profilaktycznie zaraz po posadzeniu roślin. W takich warunkach przynętę można rozsypywać również na tych obszarach, w których ślimaki szukają schronienia.

3. Ze względu na sposób produkcji preparat jest odporny na deszcz i może być stosowany przed i po deszczu, jak i przy silnej rosie.

4. Bardzo suchą powierzchnię gleby zaleca się lekko zwilżyć. Granule wchłaniają wtedy wodę i przez to stają się atrakcyjniejsze dla ślimaków.

5. Przed użyciem środka mocno zbryloną powierzchnię gleby należy wyrównać tak, aby granule pozostawały na jej powierzchni i były dostępne dla ślimaków.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Nie dotyczy.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

Nie dotyczy.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):

Nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

V PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -